

Broncopuran NF

Citrato de oxeladina 0,2%

Jarabe

1 - QUÉ ES BRONCOPURAN NF Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Contiene oxeladina, antitusivo sintético, derivado del ácido dietilfenilacético, que inhibe el reflejo de la tos en el centro bulbar en el sistema nervioso central.

Composición:

Cada 100ml de jarabe contiene: citrato de oxeladina 200mg.

Indicaciones.

Este medicamento está indicado para el alivio de la tos seca y la tos irritativa en adultos y niños mayores de 30 meses (con peso superior a 15 kg).

2 - QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USARLO:

No use Broncopuran NF si:

Es alérgico (hipersensible) al citrato de oxeladina o a algún otro ingrediente de la fórmula. Padece depresión del centro respiratorio.

Embarazo y Lactancia:

No se recomienda su uso. Si su médico le ha dicho que tiene una intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Tenga especial cuidado si:

Padece de insuficiencia renal o hepática.

Advertencias especiales

- No use este medicamento para la tos productiva. En este caso, la tos es una defensa natural necesaria para la evacuación de las secreciones bronquiales.
- No debe asociarse con medicamentos que fluidifiquen las secreciones bronquiales (expectorantes, mucolíticos).
- Si la tos se vuelve productiva, acompañada de congestión, esputo o fiebre, consulte a su médico.
- En caso de enfermedad bronquial o pulmonar crónica (a largo plazo) acompañada de tos con esputo, el consejo médico es esencial.

El uso de este medicamento no se recomienda en pacientes con intolerancia a la fructosa, síndrome de mala absorción de glucosa-galactosa o deficiencia de sacarasa / isomaltasa (enfermedades hereditarias raras).

Información importante sobre alguno de los componentes de Broncopuran NF:

Contiene sacarosa, sorbitol y sacarina sódica. Si padece una intolerancia a ciertos azúcares y/o edulcorantes, consulte con el médico antes de tomar este medicamento.

Contiene alcohol (0,6 mL/100 mL) .

Contiene metil parabeno y propilparabeno. Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas).

Nomb. Producto:	BRONCOPURAN NF - Jarabe	Presentación:	PROSPECTO
Cód. EAN:		Cód. Interno:	6842/01 - 0618
Tintas CMYK:	1 NEGRO	Sustrato:	OBRA 56 grs.
Tintas Pantone:			
Barniz:			
Troquel:	NO	Fto. Abierto	1.00 x 120 mm
Aprobación:		Plegado	XX x XXX mm
			03/07/18

Classic
Diseño & Fotografía

3 - CÓMO USAR BRONCOPURAN NF

Vía Oral

RESERVADO PARA ADULTOS Y NIÑOS DE MÁS DE 30 MESES Y MÁS DE 15 KG.

Dosificación: Use elemento dosificador

2,5 mL de jarabe contienen 5 mg de citrato de oxeladina.

5 mL de jarabe contienen 10 mg de citrato de oxeladina

Niños de 15 a 20 kg (de 30 meses a 6 años): 2.5 ml por dosis, que se repetirá después de 4 horas si es necesario, sin exceder de 3 o 4 veces al día según el peso.

Niños de 20 a 30 kg (de 6 años a 10 años): 5 ml por dosis, que se repetirá después de 4 horas si es necesario sin exceder de 2 a 3 veces al día según el peso.

Niños de 30 a 50 kg (de 10 años a 15 años): 5 ml por dosis, que se repetirá después de 4 horas si es necesario sin exceder de 3 a 5 veces al día según el peso.

Adultos: 5 ml por dosis, que se repetirá después de 4 horas si es necesario, sin exceder 5 dosis por día.

El tratamiento debe ser corto (unos pocos días) y limitado a los momentos en que se produce la tos. En caso de sobredosis o ingestión accidental acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Centro de Información o Asesoramiento Toxicológico (C.I.A.T.), teléfono: 1722, indicando nombre del medicamento y cantidad ingerida.

4 - POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

En raras ocasiones se ha observado casos de alergia: erupción cutánea, picazón, hinchazón de la piel, y tejidos debajo de la piel.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

5 - INTERACCIONES

Interacciones con otras drogas: Si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta, consulte a su médico.

Interacciones con alimentos y bebidas: Sin objeto.

Interacciones con productos herbales o terapias alternativas: Sin objeto.

5 - CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Conservar a temperatura ambiente, entre 15 y 30° C.

6 - PRESENTACIÓN

Estuche de cartulina conteniendo un frasco con 100 ml de solución y prospecto.



Laboratorios
Caillon & Hamonet S.A.C.I.
Av. Italia 5630 - Tel.: 2601 3037
Montevideo

6842/01 - 0618