

CAILLOMIDA

Regulador de la motilidad gastrointestinal. Antiemético. Bloqueante dopaminérgico.

FORMULA

Comprimidos
 Metoclopramida. Hcl10 mg
 Excipiente c.s.p1 comprimido
 Gotas
 Metoclopramida. Hcl2.6 mg
 Vehículo c.s.p1 ml

Inyectable
 Metoclopramida. Hcl10 mg
 Vehículo c.s.p 2 ml

MECANISMO DE ACCION: La metoclopramida es un derivado del ácido p-aminobenzoico, relacionado con la procainamida. Inhibe la relajación del músculo liso gástrico producido por la dopamina, potenciando las respuestas colinérgicas del músculo liso gastrointestinal.

Acelera el tránsito intestinal y el vaciamiento gástrico y aumenta la actividad del antro.

Su efecto antiemético se debe a la disminución del reflujo gastroesofágico al aumentar la presión de reposo del esfínter esofágico inferior y también la amplitud de las contracciones peristálticas esofágicas propulsivas.

INDICACIONES: Tratamiento sintomático de náuseas y vómitos. Trastornos funcionales de la motilidad digestiva. Preparación de exploraciones del tubo digestivo. Prevención y tratamiento de las náuseas y de la emesis provocadas por radioterapia, cobaltoterapia y quimioterapia antineoplásica.

POSOLOGIA: Adultos 1-2 comprimidos cada 6 a 8 horas.

En vómitos postquimioterapia la dosis puede aumentarse.

Dosis máxima: 0.5 mg/kg de peso por día repartidos en 3 a 4 tomas diarias.

Vía I/M o I/V: 1 ampolla (10 mg) cada 6 a 8 horas.

Como profilaxis en quimioterapia: 2 mg/kg de peso corporal 30 minutos antes de la infusión de citostáticos.

Tomar 40 - 45 gotas cada 6 a 8 horas.

REACCIONES ADVERSAS: Somnolencia, síndrome extrapiramidal, tensión mamaria, ginecomastia, impotencia, trastornos menstruales, hiperprolactinemia.

PRECAUCIONES: Enfermedad de Parkinson y otros trastornos extrapiramidales.

INTERACCIONES: El uso simultáneo con alcohol puede aumentar los efectos depresores sobre el sistema nervioso central. Potencia los efectos extrapiramidales de fenotiazinas, butirofenonas, reserpina. Los anticolinérgicos disminuyen su efecto sobre el vaciamiento gástrico. Disminuye la absorción del digital y aumenta la absorción del acetaminofenol.

ADVERTENCIAS: Su uso está contraindicado en niños menores de un año debido al mayor riesgo de alteraciones extrapiramidales. Su uso no está recomendado para niños y adolescentes entre 1 y 18 años. La formulación intravenosa deberá ser utilizada con precaución particularmente en adultos mayores, por riesgos de efectos neurológicos y cardiovasculares potencialmente graves.

CONTRAINDICACIONES: Epilepsia, hemorragia, obstrucción mecánica o perforación en el nivel gastrointestinal, feocromocitoma.

Contraindicado el uso concomitante de levodopa, y no se recomienda su uso en pacientes con epilepsia. El uso de metoclopramida está contraindicado durante la lactancia.

PRESENTACIONES

CAILLOMIDA comprimidos: envase conteniendo 10 - 20 comprimidos.

CAILLOMIDA gotas: envase conteniendo 17 ml.

CAILLOMIDA inyectable: envase conteniendo 6 - 100 ampollas.

Industria Uruguaya

6506-01 V0318



Laboratorios
 Caillon & Hamonet S.A.C.I.
 Av. Italia 5630 - Tel.: 2601 3037
 Montevideo

imprensa mercur s.a.