

Hibernyl

PRESENTACIONES:

Hibernyl 4

Cada comprimido contiene:
Clorfeniramina maleato 4 mg.
Excps c.s. Contiene lactosa.
Envase por 10 y 20 comprimidos recubiertos.

Hibernyl 8

Cada comprimido contiene:
Clorfeniramina maleato 8 mg.
Excps c.s. Contiene lactosa.
Envase por 10 y 20 comprimidos recubiertos.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Indicado como tratamiento en diferentes cuadros alérgicos al ser un antihistamínico de comprobada eficacia.

FARMACOLOGÍA:

Contiene maleato de Clorfeniramina, un derivado de aquilamina, con potente acción como antagonista del receptor H1 Histamina (antihistamínico). Tiene actividad antimuscarínica y leve acción sedante.

FARMACOCINÉTICA:

La absorción es relativamente lenta desde el tracto gastrointestinal. Su pico en plasma es entre 3 y 6 horas luego de su administración oral. Su biodisponibilidad es entre 30 y 50 %. Presenta un considerable metabolismo de primer paso y produce metabolitos como el desmetil y el didesmetilclorfeniramina. El 70% de la droga circula unida a proteínas plasmáticas. Tiene una amplia variación individual en la farmacocinética de la droga, se comprueba un rango amplio en los valores de su vida media. Se distribuye ampliamente en el organismo, incluyendo el peso de la barrera hematoencefálica. Se elimina principalmente por la orina como droga incambiada con sus metabolitos. La excreción es dependiente del pH urinario y la tasa de filtración. De escasa excreción por las heces. Su acción dura aproximadamente seis horas. De amplia y rápida absorción en niños, la depuración es más rápida y es menor su vida media.

INDICACIONES:

Alergias respiratorias y cutáneas. Rinitis, conjuntivitis, prurito, urticaria y dermatitis alérgica.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Administración oral.

Dosis adultos:

Hibernyl 4 - 1 comprimido (4 mg) cada 6 a 8 horas.

Hibernyl 8 - 1 comprimido (8 mg.) cada 12 horas.

Hibernyl solución: 5 ml cada 4 a 6 horas.

Dosis pediátrica:

Hibernyl Solución:

Menores de 2 años consultar al médico.

De 2 a 5 años: 1.5 ml de la medida adjunta cada 6 horas.

De 5 a 12 años: 2.5 ml de la medida adjunta cada 6 horas.

REACCIONES ADVERSAS:

Somnolencia, incoordinación motora, sedación, laxitud muscular, sequedad de boca, dificultad urinaria, constipación.

PRECAUCIONES: Evitar la ingesta de alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. Glaucoma de ángulo cerrado, retención urinaria e hiperplasia prostática. Usar con precaución en personas que conduzcan vehículos o máquinas.

Los comprimidos de Hibernyl 4 y 8 contienen lactosa. Si su médico le ha indicado que padece intolerancia a algunos azúcares, consulte con él antes de tomar el medicamento. Hibernyl solución contiene sorbitol. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Hibernyl solución contiene metil parabeno (nipagin) y propilparabeno (nipesol). Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Aumenta su acción sedante con alcohol, barbitúricos, hipnóticos, ansiolíticos y neurolepticos.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

No se han registrado efectos tóxicos durante el embarazo y la lactancia.

Industria Uruguaya

Rev. 6277/02-0816



Laboratorios
Calson & Hamonet S.A.C.I.
Av. Italia 5630 - Tel.: 2601 3037
Montevideo

At. Atención Médica

Diseno DPMO BADO
LUNA S SA
24/08/16
24/08/16