

Privalgia Flex

FORMULA: Ibuprofeno..... 400 mg
 Citrato de Orfenadrina 35 mg
 Excipientes c.s.p. 1 comprimido

FORMA DE ACCIÓN: Privalgia Flex es un agente antiinflamatorio no esteroideo que posee actividad analgésica y antipirética relacionada con la inhibición de la ciclo oxigenasa disminuyendo la síntesis del sistema de las prostaglandinas. Después de ingerido el ibuprofeno se absorbe con rapidez en su totalidad en el tubo digestivo, obteniendo una potencia analgésica de amplio espectro asociado además a un mayor efecto antitérmico estadísticamente significativo si se lo compara con el paracetamol. El Citrato de Orfenadrina es un potente relajante muscular que produce acción eficaz en los cuadros de tensión y contractura, restituyendo la funcionalidad al interrumpir el círculo vicioso de dolor-contratura-dolor, sin perturbar la conciencia ni la fuerza muscular. La asociación de estos fármacos, provee a Privalgia Flex de una eficaz acción analgésica y antiinflamatoria con actividad miorelajante sostenida, con el objetivo de normalizar el tono muscular restituyendo la funcionalidad.

INDICACIONES: Afecciones músculo esqueléticas con contracturas acompañadas de dolor.
POSOLOGÍA: Adultos: Según indicación médica: en procesos dolorosos, se sugiere de 1 a 2 comprimidos cada 6-8 horas. En caso de dolores intensos se aconseja iniciar el tratamiento con 2 comprimidos en una sola toma. Se recomienda no sobrepasar la dosis máxima diaria de 1200 mg de ibuprofeno, equivalente a 3 comprimidos de Privalgia Flex.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad conocida al Ibuprofeno y/o a la orfenadrina. Relacionadas con el ibuprofeno: Coagulopatía. Insuficiencia cardíaca severa. Úlcera péptica activa. Hemorragia activa. Insuficiencia hepática severa. Relacionadas con la orfenadrina: Hipertrofia prostática o uretral. Megaesófago. Obstrucción pilórica duodenal. Glaucoma. Miastenia gravis. Embarazo y lactancia: no está indicado su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS: Relacionadas con Ibuprofeno: Asma. Puede desencadenar broncoespasmo. Úlcera gastroduodenal. Insuficiencia hepática. Mayores de 65 años: disminuir dosis. Relacionadas con orfenadrina: Asma. Insuficiencia cardíaca. Coronariopatía. Arritmia. Tratamientos prolongados. Seguridad y eficacia no establecida en menores de 12 años.

INTERACCIONES: Relacionadas con Ibuprofeno: Aumenta la concentración de litio y fenitoína. Aumenta los efectos adversos de metotrexato e hipoglucemiantes. Aumenta el riesgo de hemorragias con otros AINE, trombolíticos, anticoagulantes cumarínicos, heparina y ticlopidina. Desmopresina aumenta sus efectos. Interferón alfa y antihipertensivos disminuyen sus efectos. Diuréticos aumentan sus efectos adversos renales. Antiácidos, demulcentes y fármacos de acción local gástrica afectan su absorción. Relacionadas con Orfenadrina: en asociación con dextropropoxifeno riesgo de hipoglucemia. Aumenta el efecto de anticolinérgicos.

REACCIONES ADVERSAS: Relacionadas con Ibuprofeno: Epigastralgia, náuseas, vómitos, diarrea. Úlcera y erosión gastroduodenal, más frecuente en tratamientos crónicos, hemorragia digestiva. Relacionadas con orfenadrina: Mareos, ansiedad, confusión. Síndrome anticolinérgico: sequedad de boca, palpitaciones, retención de orina, visión borrosa, aumento de la presión intraocular, midriasis, náuseas, vómitos, estreñimiento. Hipersensibilidad leve hasta shock anafiláctico.

PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 10, 50, 100 y 250 comprimidos.

Industria Uruguaya

6531/02 - 0918



Laboratorios
 Caillon & Hamonet S.A.C.I.
 Av. Italia 5630 - Tel.: 2601 3037
 Montevideo

Nomb. Producto:	PRIVALGIA FLEX	Presentación:	PROSPECTO
Cód. EAN:		Cód. Interno:	6531/02 - 0918
Tintas CMYK:	1 NEGRO	Sustrato:	OBRA 56 grs.
Tintas Pantone:			
Barniz:			
Troquel:	NO	Fto. Abierto	100 x 120 mm
Aprobación:	14/09/2018	Plegado	XX x XXX mm

Classic Diseño & Fotografía