

REACCIONES ADVERSAS:

Relacionadas con el Ibuprofeno:

Epigastralgia, náuseas, vómitos, diarrea. Úlcera y erosión gastroduodenal, más frecuente en tratamientos crónicos, hemorragia digestiva.

Relacionadas con la cafeína:

Provoca ansiedad, eventualmente náuseas y vómitos y poliquiuria.

A altas dosis: inquietud, cefaleas, convulsiones, dolor torácico. Su uso crónico genera farmacodependencia y su retirada brusca síndrome de abstinencia.

Relacionadas con la ergotamina tartrato:

Náuseas, vómitos, dolor epigástrico. Diarrea, palidez cutánea, mareos, parestesias, espasmos arteriales severos, dolor torácico y cefalea.

Intoxicación aguda: náuseas, vómitos, diarrea, sed extrema, cefaleas, frialdad acral que puede terminar en gangrena. Hipotensión, shock, convulsión y coma.

Intoxicación crónica (ergotismo): trastornos circulatorios severos, palidez y cianosis distal. Cefaleas crónicas de rebote por abstinencia.

PRESENTACIONES:

Estuche o sobre conteniendo blister con 10 comprimidos y prospecto.

Rev: 6532/01-0516



Laboratorios
Caillon & Hamonet S.A.C.I.
Av. Italia 5630 - Tel.: 2601 3037
Montevideo

Sanfer SRL

habla, de la visión, sensación de hormigueo en dedos de manos y pies y alrededor de la boca (migraña hemipléjica o basilar)

- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

Embarazo y lactancia: Uso contraindicado.

PRECAUCIONES/ADVERTENCIAS

Relacionadas con el ibuprofeno:

- Si tiene edemas,

- Si padece o ha padecido algún trastorno del corazón o tiene tensión arterial alta,

- Si padece asma o cualquier otro trastorno respiratorio,

- Si está recibiendo tratamiento por una infección ya que el ibuprofeno puede enmascarar la fiebre

- Si padece una enfermedad de los riñones o del hígado, tiene más de 60 años o necesita tomar el medicamento de forma prolongada (más de 1 a 2 semanas), es posible que su médico deba efectuar controles de forma regular. Su médico le indicará la frecuencia de estos controles,

- Si presenta síntomas de deshidratación, p.ej. diarrea grave o vómitos tome abundante líquido y contacte inmediatamente a su médico, ya que ibuprofeno en este caso concreto podría provocar como consecuencia de la deshidratación una insuficiencia renal.

- Si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el estómago o en el duodeno, pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o por heces de color negro, o incluso sin síntomas previos de alerta, este riesgo es mayor cuando se utilizan dosis altas y tratamientos prolongados, en pacientes con antecedentes de úlcera péptica y en los pacientes de edad avanzada. En estos casos su médico considerará la posibilidad de asociar un medicamento protector del estómago,

- Si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre como anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios del tipo del ácido acetilsalicílico. También debe comentarle la utilización de otros medicamentos que podrían aumentar el riesgo de dichas hemorragias como los corticoides y los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina,

- Si padece la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa

- Si está en tratamiento con diuréticos, si padece lupus eritematoso sistémico

- Si padece porfiria intermitente aguda

- Si sufre dolores de cabeza tras un tratamiento prolongado no debe tomar dosis más elevadas del medicamento

- Es aconsejable no tomar este medicamento si tiene varicela,

Precauciones cardiovasculares: Los medicamentos como ibuprofeno se pueden asociar con un moderado aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos o cerebrales. Dicho riesgo es más probable que ocurra cuando se emplean dosis altas y tratamientos prolongados. No exceda la dosis ni la duración del tratamiento recomendado. Si usted tiene problemas cardíacos, antecedentes de ataques cerebrales, debe consultar este tratamiento con su médico. Asimismo este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca y/o tensión arterial elevada.

Precauciones durante el embarazo y en mujeres en edad fértil: Debido a que la administración de medicamentos del tipo ibuprofeno se ha asociado a un aumento del riesgo de sufrir ano-

PRIVALGIA MIGRA

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido contiene:

FORMULA: Ibuprofeno	400 mg
Cafeína	100 mg
Ergotamina Tartrato	1 mg
Excipientes c.s.	1 comprimido
Contiene Lactosa	

INDICACIONES

Jaquecas, migrañas y cefaleas tensionales.

POSOLÓGIA

Comenzar con 1 comprimido al iniciarse los primeros síntomas de ataque agudo de migraña; si fuera necesario ingerir un segundo comprimido más a los 60 minutos. Puede ingerirse hasta 3 comprimidos al día.

Puede tomarlo solo o con los alimentos. En general se recomienda tomarlo antes de las comidas o con leche para reducir así la posibilidad de que se produzcan molestias en el estómago.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Relacionadas con el ibuprofeno:

- Si es alérgico a ibuprofeno, a otros medicamentos del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), a la aspirina o a cualquiera de los demás componentes de PRIVALGIA MIGRA. Las reacciones que indican la alergia podrían ser: erupción cutánea con picor, hinchazón de la cara, labios o lengua, secreción nasal, dificultad respiratoria o asma,

- Si padece una enfermedad grave del hígado o los riñones,

- Si ha tenido una úlcera o hemorragia de estómago o de duodeno o ha sufrido una perforación del aparato digestivo,

- Si vomita sangre,

- Si presenta heces negras o una diarrea con sangre,

- Si padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea, o está tomando anticoagulantes. Si es necesario utilizar a la vez medicamentos anticoagulantes, el médico realizará unas pruebas para la coagulación sanguínea,

- Si padece una insuficiencia cardíaca grave,

- Si se encuentra en el tercer trimestre del embarazo.

Relacionadas con la ergotamina tartrato y cafeína:

- Si sufre trastornos circulatorios periféricos, enfermedad vascular que disminuye el riego sanguíneo de brazos y piernas (Enfermedad vascular obliterante), enfermedad cardíaca por disminución del riego sanguíneo del corazón (Cardiopatía isquémica), hipertensión mal controlada, estado de infección generalizada (Sepsis o shock)

- Si sufre insuficiencia hepática o renal severa

- Si sufre una enfermedad inflamatoria de la arteria temporal (Arteritis temporal)

- Si sufre migrañas acompañadas de síntomas neurológicos como alteración del equilibrio, del

malías congénitas/abortos no se recomienda la administración del mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible. En el tercer trimestre la administración de ibuprofeno está contraindicada. Para las pacientes en edad fértil se debe tener en cuenta que los medicamentos del tipo ibuprofeno se han asociado con una disminución de la capacidad para concebir.

Relacionadas con la ergotamina tartrato y cafeína: El medicamento está sólo indicado para el tratamiento de los ataques agudos de migraña y no como tratamiento para prevenir su aparición. Debe evitarse el uso continuado o su uso a dosis superiores a las recomendadas ya que con dosis superiores a las recomendadas puede producirse vasoespasmio (contracción de las arterias que puede dar lugar a trastornos cerebrales, cardíacos) y tras tratamientos prolongados pueden aparecer alteraciones de la pleura, del peritoneo o, más raramente, de las válvulas cardíacas. Si aparecen síntomas como hormigueo en los dedos de manos y pies, interrumpa el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico.

Las personas afectadas por alteración leve o moderada de la función hepática deberán ser controladas por su médico.

INTERACCIONES

Relacionadas con el Ibuprofeno:

Informe a su médico si está utilizando, o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento. Los medicamentos citados a continuación pueden interferir y, por tanto, no deben tomarse junto con ibuprofeno sin antes consultar a su médico:

- otros antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, medicamentos anticoagulantes (por ejemplo, ácido acetilsalicílico, warfarina, ticlopidina), medicamentos contra la hipertensión arterial (inhibidores de la ECA, enzima convertidora de la angiotensina, p. ej., captopril, betabloqueantes, antagonistas de la angiotensina II), litio, metotrexato, mifepristona, digoxina y otros glucósidos cardiotónicos, hidantoínas como fenitoína, sulfamidas como sulfametoxazol y cotrimoxazol, corticoides como cortisona y prednisona, diuréticos, pentoxifilina,

- probenecid, antibióticos del grupo de las quinolonas como norfloxacina, sulfonilureas como tolbutamida, tacrolimus o ciclosporina, zidovudina, antihipertensivos, trombolíticos, antibióticos aminoglucósidos como neomicina, extractos de hierbas del árbol Ginkgo biloba.

Relacionadas con la ergotamina tartrato:

La administración de antibióticos macrólidos (eritromicina, claritromicina), medicamentos para el tratamiento de la infección por el HIV (p.ej. ritonavir, indinavir, nelfinavir, amprenavir) o medicamentos para el tratamiento de las infecciones por Hongos (p.ej. ketoconazol, itraconazol, voriconazol) con Privalgia Migra puede producir una falta de riego ya que aumentan los niveles de ergotamina en sangre. Otros medicamentos que pueden provocar interacciones son: medicamentos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y la tensión arterial como propranolol, otros preparados que contengan alcaloides del cornezuelo del centeno, nicotina (p.ej. fumar en exceso) y medicamentos para el tratamiento de la migraña como sumatriptán. Debe evitarse el uso excesivo de ergotamina ya que puede agravar y aumentar la frecuencia de aparición de sus dolores de cabeza.