

<b>Nomb. Producto:</b>	DICLOFENAC GEL	<b>Presentación:</b>	PROSPECTO
<b>Cód. EAN:</b>		<b>Cód. Interno:</b>	6512/02 - 1223
<b>Tintas CMYK:</b>	1 NEGRO	<b>Sustrato:</b>	
<b>Tintas Pantone:</b>			
<b>Barniz:</b>			
<b>Troquel:</b>	NO	<b>Fto. Abierto</b>	200 x 120 mm
<b>Aprobación:</b>	22/12/2023	<b>Plegado</b>	100 x 120 mm
<b>Observaciones:</b>	<b>Nota: Se actualiza por obs. M.S.P. de fecha oct. 23.</b>		

O.T. 3936



Laboratorios  
Caillon & Hamonet S.A.C.I.  
Av. Italia 5630 - Tel.: 2601 3037  
Montevideo

Industria Uruguaya

6512/02 - 1223

## DICLOFENAC CAILLON & HAMONET

Diclofenac dietilamina 1.16 %  
Gel

### 1. QUÉ ES DICLOFENAC CAILLON & HAMONET Y PARA QUÉ SE UTILIZA:

El diclofenac dietilamina, principio activo de este medicamento, pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos y actúa como analgésico y antiinflamatorio local. Diclofenac Caillon & Hamonet está indicado en adultos y adolescentes mayores de 14 años para el alivio local del dolor y de la inflamación leves y ocasionales producidos por:

- pequeñas contusiones, golpes, distensiones
- Torticolis u otras contracturas
- lumbalgias
- esguinces leves producidos como consecuencia de una torcedura

### 2. ANTES DE USAR DICLOFENAC CAILLON & HAMONET:

**No use el producto:**

**Si es alérgico al diclofenac o a cualquier otro medicamento antiinflamatorio no esteroideo utilizado en el tratamiento del dolor, la fiebre o la inflamación como el ibuprofeno o ácido acetilsalicílico,** o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Los síntomas relacionados con una reacción alérgica a estos medicamentos pueden ser: asma, dificultad en la respiración, erupción cutánea o picor, hinchazón en la cara o en la lengua y goteo nasal.

- Si está en los 3 últimos meses del embarazo.
- Si es menor de 14 años.
- No aplicar sobre heridas, lesiones eczematosas, mucosas, ni en quemaduras.

### Tenga especial cuidado con Diclofenac Caillon & Hamonet:

- No aplicar en lugares de la piel donde existan cortes o heridas abiertas, ni en las mucosas, ni sobre eczemas o lugares de la piel donde haya una erupción de la piel. Deje de utilizar el medicamento si se produce una erupción en la piel tras la aplicación.
- No utilizar en zonas extensas, utilizar exclusivamente en la zona afectada.
- Evite el contacto del producto con los ojos. Si esto ocurriera, aclare los ojos con agua limpia. Consulte a su médico en caso de que sienta alguna molestia posterior.
- No utilizar vendajes oclusivos.
- No utilizar más cantidad del medicamento de la indicada, ni durante un periodo de tiempo superior al indicado, salvo por consejo de su médico.
- No aplicar simultáneamente Diclofenac Caillon & Hamonet en la misma zona en la que se hayan aplicado otros medicamentos.
- No ingerir este medicamento ni lo utilice en la boca. Diclofenac Caillon & Hamonet es para uso externo únicamente. Consulte a su médico en caso de ingestión accidental.
- Las zonas tratadas no deben exponerse al sol (aun estando nublado) ni a lámparas de radiaciones ultravioleta (rayos UVA).
- No utilizar durante el primer y segundo trimestre de embarazo salvo criterio médico.

**Uso de otros medicamentos:**

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, especialmente analgésicos, incluso los adquiridos sin receta.

**Embarazo, lactancia y fertilidad:**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

**Embarazo:**

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento.  
Durante los seis primeros meses de embarazo sólo debe utilizarse Diclofenac Caillon & Hamonet después de consultarlo con su médico. Durante los tres últimos meses de embarazo, no debe utilizarse este medicamento, ya que puede dañar al futuro bebé, o causar problemas en el parto.

**Lactancia:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.  
En periodo de lactancia no use Diclofenac Caillon & Hamonet, excepto que se lo haya indicado su médico, ya que el diclofenac pasa a la leche materna en pequeñas cantidades.  
No debe aplicarse en ningún caso en madres en periodo de lactancia directamente sobre la zona del pecho, ni en otras zonas en áreas extensas de la piel durante periodos prolongados de tiempo.

**Uso en niños:**

Este medicamento no está recomendado para uso en niños y adolescentes menores de 14 años, debido a que no hay suficientes datos disponibles sobre seguridad y eficacia.

**Conducción y uso de máquinas:**

No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad para conducir vehículos y de usar maquinaria cuando se usa externamente sobre la piel.

**Información importante sobre algunos de los componentes de Diclofenac Caillon & Hamonet:**

Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene propilenglicol.  
Este medicamento contiene metilparabeno y propilparabeno, puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas).

**3. CÓMO USAR DICLOFENAC CAILLON & HAMONET:**

Siga exactamente las siguientes instrucciones de administración de Diclofenac Caillon & Hamonet, a no ser que su médico le haya indicado otras distintas. Este medicamento es para aplicarlo únicamente sobre la piel (uso cutáneo).

**La dosis normal es:**

Adultos y adolescentes mayores de 14 años: Aplicar 3 ó 4 veces al día una pequeña cantidad de gel sobre la zona inflamada o dolorida. La cantidad de gel variará dependiendo del tamaño de la zona afectada (normalmente, será suficiente aplicar una cantidad similar al tamaño de entre una cereza y una nuez). Utilice la menor cantidad necesaria durante el menor tiempo que sea requerido.

**Modo de utilización:**

- Extienda una fina capa del gel sobre la zona de la piel donde exista el dolor y la inflamación, mediante un suave masaje.
- Cierre bien el tubo después de su utilización.
- Lávese las manos después de la aplicación del gel, a no ser que estas sean el área a tratar.

Si el dolor o la hinchazón empeoran o persisten después de 7 días de tratamiento, consulte con su médico.

**Si olvidó usar Diclofenac Caillon & Hamonet:**

Si olvidó aplicar este medicamento cuando correspondía, aplique el gel tan pronto como sea posible y continúe de manera normal el tratamiento. No aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

**Si usa más Diclofenac Caillon & Hamonet del que debiera:**

Si ingiere accidentalmente Diclofenac Caillon & Hamonet o si lo ha utilizado sobre una gran zona de la piel y durante un largo período de tiempo, pueden ocurrir reacciones adversas similares a las producidas por el diclofenac cuando se toma por vía oral (por ej. comprimidos). Los síntomas principales por sobredosis son: trastornos digestivos o renales y dificultad para respirar.  
Si ha aplicado demasiada cantidad del medicamento, se recomienda eliminarla lavando la zona afectada con abundante agua, o bien, retirando una parte.  
En caso de sobredosis o de ingestión accidental consulte inmediatamente a un centro médico o llame al Centro de Información o Asesoramiento Toxicológico (C.I.A.T.) , teléfono 1722, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

**4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:**

Al igual que todos los medicamentos, Diclofenac Caillon & Hamonet puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

**Algunos efectos adversos raros y muy raros pueden ser graves:**

**Si usted experimenta alguno de los siguientes signos de alergia, deje de usar el producto y consulte con un médico inmediatamente.**

- Raros (observados entre 1 y 10 de cada 10.000 pacientes): Erupción de la piel acompañada, o no, de ampollas; urticaria.
- Muy raros (observados en menos de 1 de cada 10.000 pacientes): Dificultad para respirar o sensación de presión en el pecho; hinchazón en la cara, labios, lengua o garganta.

**Efectos adversos no graves:**

Pueden producirse otros efectos adversos, pero éstos suelen ser leves y de duración transitoria. Si nota alguno de ellos, consulte con su médico lo antes posible.

- Frecuentes (observados entre 1 y 10 de cada 100 pacientes): Erupción, picor, enrojecimiento o escozor en la piel después de usar el producto.
- Muy raros (observados en menos de 1 de cada 10.000 pacientes): La piel pudiera ser más sensible a la luz del sol. Los signos son: quemadura solar con picor, hinchazón y ampollas.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

**5. ASPECTO DEL PRODUCTO Y CONTENIDO DEL ENVASE:**

Diclofenac Caillon & Hamonet es un gel de consistencia blanda, incoloro, con olor a mentol. Se presenta en un tubo de aluminio conteniendo 40 gramos de gel, contenido en estuche de cartulina con prospecto.

**6. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Conservar a temperatura ambiente (15-30)°C.